



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro
Cardiff and Vale
University Health Board

Ffurflen atgyfeirio - at Awdioleg Pediatrig

Enw:.....

Dyddiad Geni:.....

Cyfeiriad:.....

Rhif ffôn y rhiant:.....

Rhif yr ysbyty:.....

Rhif y GIG:.....

Meddyg Ymgynghorol:.....

Meddyg Teulu:.....

A fydd angen cyfieithydd ar y teulu Bydd/Na fydd Iaith:.....

Rheswm dros atgyfeirio

Gweler y canllawiau atgyfeirio ar gefn y ffurflen hon

Babanod nad ydynt yn addas ar gyfer sgrinio clyw babanod newydd-anedig neu yn ôl disgresiwn y clinigwr am arwydd arall. Atgyfeiriwch yn uniongyrchol at awdioleg trwy e-bost i gael asesiad fel baban newydd-anedig. Rhewch fanylion yn y blwch isod.

Babanod sy'n pasio'r sgrinio ond y gwyddys eu bod mewn mwy o berygl o golled clyw - Atgyfeiriwch at awdioleg trwy e-bost, i gael profion/monitro wedi'i dargedu (byddant yn cael eu hasesu yn 9 mis oed). Rhewch fanylion yn y blwch isod.

Enw'r Atgyfeiriwr:

Dyddiad atgyfeirio:.....

(Printiwch yr enw)

Manylion cyswllt at gyfer yr atgyfeiriwr:..... Meddyg Ymgynghorol:.....

E-bost: Paedsaudiology.cav@wales.nhs.uk



Canllawiau ar gyfer atgyfeirio

Dylid atgyfeirio babanod nad ydynt yn addas ar gyfer sgrinio clyw babanod newydd-anedig (NBHSW) yn uniongyrchol at awdioleg trwy e-bost i'w hasesu fel babanod newydd-anedig.

1 Microtia ac atresia tiwb y glust allanol - y rheswm dros yr eithriad hwn yw y bydd y babanod hyn bob amser â rhywfaint o golled clyw.

2 Llid yr ymennydd bacterol newyddenedigol neu septicemia meningococol - BRYS

Wedi'i gadarnhau neu ei amau'n gryf gan Bediatregydd neu Neonatolegydd llid yr ymennydd bacterol (unrhyw organeb), neu septicemia meningococol. Gwneir yr eithriad hwn oherwydd bod y risg o golled clyw synwyrnerfol (SNHL) yn uchel iawn.

3 Siyntiau Fentrigwlo-peritoneol (PVP) rhaglenadwy yn eu lle - mae'r eithriad hwn oherwydd y risg y bydd meysydd magnetig yn deillio o droswyr ysgogiad awdiolegol yn effeithio ar y siynt.

4 Sytomegalofirws cynhenid wedi'i gadarnhau (cCMV) – BRYS

Gwneir yr eithriad hwn oherwydd bod y risg o golli clyw yn uchel iawn a bod y cyfnod o gyfle ar gyfer triniaeth yn fyr. BRYS angen atgyfeiriad

Arall

Cyffuriau ototocsig - **Nid** yw defnyddio Gentamicin yn wrtharwydd felly cynigir NBHSW. Os oes hanes o lefelau cyffuriau ototocsig y tu allan i'r ystod therapiwtig neu hanes teuluol o golled clyw yn gysylltiedig â gentamicin Paediatregydd / Neonatolegydd i atgyfeirio at awdioleg ar gyfer asesiad diagnostig. (Ystyriwch ddadansoddiad DNA Mitocondriaidd, yn enwedig os gwneir diagnosis o Ffeibrosis Systig)

Hyperbilirubinemia dirediad difrifol

Babanod sy'n pasio'r sgrinio ond y gwyddys eu bod mewn mwy o berygl o golled clyw ac mae angen eu hatgyfeirio at awdioleg i gael profion/monitro wedi'i dargedu yn 9 mis oed drwy e-bost.

Babanod sydd â risg uwch o golli clyw ('cyflyrau arwyddocaol posibl'):

1 Syndromau sy'n gysylltiedig â cholled clyw (gan gynnwys syndrom Down)

2 Annormaleddau'r wyneb a'r penglog, gan gynnwys taflod hollt

3 Haint cynhenid wedi'i gadarnhau (tocsoplasmosis neu Rwbela)

4 Isthroidedd cynhenid

Sylwch – Mae hanes teuluol y tu allan i'r canllawiau cenedlaethol – Fodd bynnag, os oes hanes o golled clyw parhaol mewn rhiant neu frawd neu chwaer, dylid atgyfeirio'r plentyn (nid colled clyw dros dro yn ymwneud â chlust ludiog/heintiau neu golled clyw sy'n gysylltiedig ag oedran/sy'n cael ei achosi gan sŵn). **Cyfrifoldeb yr Ymwelydd Iechyd yw gwneud atgyfeiriadau ar gyfer hanes teuluol.**

I drafod unrhyw atgyfeiriad, cysylltwch â Dr Zeba Khan Zeba.Khan@wales.nhs.uk, Dr Nicole Pickerd Nicole.Pickerd@wales.nhs.uk



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro
Cardiff and Vale
University Health Board

<https://www.gov.uk/government/publications/surveillance-and-audiological-referral-guidelines/guidelines-for-surveillance-and-audiological-referral-for-infants-and-children-following-newborn-hearing-screen>