

Sgan Uwchsain Atgyweirio Ymlediad Endofasgwlaidd (EVAR)

Beth yw hwn?

Mae EVAR yn stent a ddefnyddiwyd i atgyweirio eich ymlediad aortaidd yn yr abdomen (AAA). Yn y llawdriniaeth hon, nid ydym yn tynnu'r ymlediad hwn; Mae'r stent wedi'i osod y tu mewn i'r aorta. Mae gwaed yn llifo drwy'r stent ac nid trwy'r hen sach ymlediad. Weithiau cyfeirir at y stent fel impyn trowsus oherwydd gall edrych fel pâr o drowsus lle mae'n cyflenwi pob aelod (gweler y llun isod).

Pam ydw i'n cael y prawf hwn?

Er bod EVAR yn llawdriniaeth lwyddiannus ar gyfer trin AAA, weithiau gall achosi cymhlethdodau a allai fod angen ymyriadau pellach. Mae'r cymhlethdodau yn cynnwys y stent yn symud, pibellau gwaed yn mynd i mewn i'r stent a difrod stent. Byddwn yn cadw llygad ar eich EVAR bob blwyddyn i sicrhau ein bod yn dod o hyd i unrhyw broblemau. Bydd delweddu dilynol o'ch EVAR yn cynnwys cyfuniad o uwchsain, pelydr-x a CT.

Sut mae'r uwchsain EVAR yn cael ei gyflawni?

Gall sgan uwchsain eich stent gael ei alw'n sgan dwplecs neu sgan Doppler. Bydd y prawf hwn yn cynhyrchu delweddau o'ch stent EVAR a'r llif gwaed ynddo. Yn ystod y sgan, bydd y gwyddonydd clinigol (a all fod yn wryw neu'n fenyw) yn monitro maint y sach ymlediad sy'n weddill (i wneud yn siŵr nad yw'n mynd yn fwy) ac i sicrhau nad oes gwaed yn mynd i




GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro
Cardiff and Vale
University Health Board

mewn i'r sach. Bydd gofyn i chi orwedd ar eich cefn a bydd gel yn cael ei roi ar yr abdomen a thuag at bob gafl. Bydd y goleuadau'n cael eu gostwng fel bod y gwyddonydd yn gallu gweld y sgrin yn well. Efallai y rhoddir rhywfaint o bwysau ar yr ardal i helpu gweld y stent. Nid oes unrhyw risg yn gysylltiedig â'r sgan uwchsain. Gall y sgan gymryd 30-45 munud.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y gwyddonydd clinigol yn esbonio'r canfyddiadau ac yn ysgrifennu adroddiad ar gyfer llawdriniaeth fasgwlaidd. Ar ôl y sgan, byddwch yn mynd am belydr-x (mewn radioleg). Byddwn yn rhoi ffurflen atgyfeirio i chi fynd gyda chi. Byddwn yn eich gweld yn flynyddol i fonitro'r stent. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i'r gwyddonydd clinigol drafod y canlyniad gyda meddyg cyn i chi adael.



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro
Cardiff and Vale
University Health Board